



新冠加強針怎麼打？

大華府社區健康服務中心新冠疫苗問答更新



美國 CDC 建議 5 歲及以上人群都要接種 COVID-19 疫苗，以幫助預防 COVID-19。

關於全美的新冠疫苗使用，從九月下旬開始，好消息不斷。先是輝瑞疫苗 (Pfizer-BioNTech) 加強針獲得 FDA 和 CDC 的批准使用。一個月之後的十月下旬，莫得納 (Moderna) 和強生疫苗 (J&J/Janssen) 的加強針也被批准。十月底，輝瑞疫苗被批准給 5-11 歲兒童接種。至此，全部三種新冠疫苗都可以打加強針，兒童也可以打新冠疫苗。這對於維持和加強疫苗的有效保護力及擴大接種和保護的人群範圍無疑是極好消息。不過，由於多種疫苗加強針的同時使用，以及疫苗接種年齡的規定，不少社區居民感覺目前的疫苗信息有些紛雜。

為了幫助大華府地區華人同胞更多瞭解新冠疫苗加強針及兒童新冠疫苗的信息，大華府華裔社

區健康服務中心的醫學專業背景義工根據 CDC 及本地衛生局的信息整理了本篇新冠疫苗中文問題解答更新。

目前哪些人可以打加強針？

具有以下五種情況者，目前可以打加強針：

1. 接種了輝瑞或莫得納疫苗的免疫功能低下者，可在第二針打完 28 天後打第三針疫苗。
2. 65 歲及以上年齡的輝瑞或莫得納疫苗接種者，打完第二針後至少六個月。
3. 18-64 歲有基礎疾病的輝瑞或莫得納疫苗接種者，打完第二針後至少六個月。
4. 從事新冠感染高風險職業的 18-64 歲輝瑞或莫得納疫苗接種者，打完第二針後至少六個月。

5. 所有 18 歲及年齡以上的強生疫苗接種者，打完第一針兩個月之後。

兩點說明：

1. 免疫功能低下是指癌症患者或器官移植者等中、重度免疫功能低下者。有基礎疾病是指患癌症、慢性腎臟疾病、肺病、糖尿病、高血壓、心臟病、重度肥胖等疾病而對感染新冠病毒後出現嚴重症狀具有較高風險者。關於什麼情況算是免疫功能低下和患哪些疾病算是具有新冠高風險疾病，CDC 有明確的解釋。由於篇幅所限，此處不做詳細說明。需要瞭解者，可登錄 CDC 官方網站查看完整信息 (<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html>)，並在必要時諮詢你的家庭醫生。

2. 去打疫苗時，是否有基礎疾病或從事新冠高風險職業由自己聲明，不需要醫生證明或單位證明。

- * 我應該打哪一種疫苗？
- * 打加強針疫苗有什麼風險？
- * 兒童可以打新冠疫苗了？
- * 到哪兒去打疫苗？

(更多詳情見 A14 版)

大華府華裔社區健康服務中心中文幫助電話：

571-668-5836

240-658-9228

兩個熱綫電話都提供中文普通話和廣東話服務，也可以發中文短信聯繫。(大華府華裔社區健康服務中心供稿)

華府大專院校校友會
聯合會助力
2022 冬奧系列活動

>>詳見 A4 版

開着房車游美國
經驗分享會

>>詳見 5 版

臺媒：7.6 萬劑“高端”
疫苗被放到過期

>>詳見 A16 版

上海東方醫院
在南極專設醫療點

>>詳見 A20 版

美國超 10 萬人
並非死於新冠

>>詳見 A23 版



微信搜一搜

華盛頓中文郵報

Learn2Smart Alpha Smart Test Prep

Alpha 智慧備考系統，為進入夢想大學助力

數據驅動 精準診斷 個性化指導 高效提分

www.learn2smart.com

目前的課程：SAT, PSAT, AP Statistics, Research Methods, Data Analysis
諮詢請聯系：郵箱 customer@learn2smart.com 電話 2407160083